2020

BUSINESS MATHEMATICS AND STATISTICS — GENERAL

(C3HG)

Paper: GE-3.1/Chg

Full Marks: 80

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

প্রান্তলিখিত সংখ্যাণ্ডলি পূর্ণমান নির্দেশক।

মডিউল - ১

বিভাগ - ক

যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

 $x \times x$

১। যদি $\log_{10} 2 = p$ হয়, তবে $\log_{10} 5$ -এর মান হল

$$(\bar{q}) \frac{1}{p}$$

$$(\mathfrak{F}) \frac{1}{p} \qquad \qquad (\mathfrak{F}) \quad 1-p$$

(গ)
$$p-1$$

(গ)
$$p-1$$
 (ঘ) কোনোটিই নয়।

২। যদি $\log_x 8 = \log_4 64$ হয় তবে x =

৩। দৃটি সংখ্যার গুণোত্তরীয়মধ্যক হল 10 এবং একটি সংখ্যা হল 5, তবে অন্যটির মান হল

8। $\left(x+\frac{1}{2x}\right)^{2n}$ -এর মধ্যপদটি হল

$$(\overline{\Phi}) \frac{(2n)!}{n!}$$

(
$$\overline{a}$$
) $\frac{(2n)!}{n!}$ (\overline{a}) $\frac{(2n)!}{(n!)^3}$

$$(\mathfrak{I}) \frac{(2n)!}{(n!)^2}$$

(গ)
$$\frac{(2n)!}{(n!)^2}$$
 (되) $\frac{(2n)!}{(n-1)!}$

৫। $(1+x)^{2n}$ এই বিস্তৃতির দ্বিপদসহগ সমূহের সমষ্টি হল

$$(\overline{\Phi}) 2^n$$

ঙ। দুটি অশুন্য সেট A এবং B-এর জন্য $(A-B) \cap (B-A) =$

91 ${}^{n}C_{r} + {}^{n}C_{r-1} = ?$


(화)
$$^{n+1}C_{r-1}$$
 (약) $^{n+1}C_r$

(약)
$$^{n+1}C_r$$

(গ)
$${}^nC_{r+1}$$

(গ)
$${}^{n}C_{r+1}$$
 (ঘ) ${}^{n+2}C_{r}$ |

Please Turn Over



১৮।	যদি (1	$+x)^n$	এর	পদসখ্যা	11	হয়,	ত্বে	পঞ্চম	পদের	মান	হল
-----	--------	---------	----	---------	----	------	------	-------	------	-----	----

- (ক) $\frac{210}{x^4}$ খে) $210x^4$
- (গ) 105 x^3
- (되) $210x^4$.

১৯। দ্বিপদ উপপাদ্য প্রয়োগ করিয়া (99)⁴ -এর মান হল

- (季) 9,60,59,605
- (খ) 9,60,59,601
- (গ) 9,60,58,601 (ঘ) কোনোটাই নয়।

২০।
$$\log 2 + 16 \log \frac{16}{15} + 12 \log \frac{25}{24} + 7 \log \frac{81}{80}$$
 -এর মান হল

- $(\overline{\Phi})$ 0
- (뀍) 5

- (গ) 1
- (ঘ) 2.

২১। যদি
$$\log_6 x = -3$$
, হলে x -এর মান হল

- (학) $\frac{1}{6}$ (খ) $\frac{1}{216}$
- (গ) $\frac{1}{3}$
 - $(\mathfrak{P}) = \frac{1}{18}$.

২২। বার্ষিক
$$6\%$$
 চক্রবৃদ্ধি হার সুদে 4 বৎসর পর সুদে-আসলে $12,625$ টাকা হলে, উহার বর্তমান মূল্য হল $[(1.06)^4=1.2625]$

- (季) Rs. 8,000
- (খ) Rs. 12,000
- (গ) Rs. 10,000
- (ঘ) Rs. 9,000.

- (季) 10 years
- (켁) 12 years
- (গ) 9 years (ঘ) 6 years.

২৪। যদি
$$^{14}\,C_r=^{14}C_{r+2}$$
 হয় তবে r -এর মান হল

- (季) 12
- (খ) 6

- (গ) 7
- (ঘ) 14.

২৫। 3, 5, 7, 8, 9 এই অঙ্কণুলির সাহায্যে কোনো অঙ্কের পুনরাবৃত্ত না করিয়া 7,000 অপেক্ষা বৃহত্তর সংখ্যাণ্ডলি হল

- (季) 120
- (খ) 192

- (গ) 60
- (ঘ) none of these.

মডিউল - ২

বিভাগ - ক

যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

২×৫

২৬। যদি
$$n(A)=2,\; n(B)=3$$
 এবং $P(A\times B)$ হল $A\times B$ -এর সূচক সেট, তবে $n(P(A\times B))=?$

- (季) 8
- (খ) 16
- (গ) 32
- (ঘ) 64 |

R(3rd Sm.)-Business Math. and Statistics-(4)G/GE-3.1Chg(C3HG)/CBCS ২৭। দুটি attribute A এবং B ধনাত্মক association হবে যদি $(\mathfrak{A}) (AB) < \frac{(A) \times (B)}{N}$ $(\overline{\Phi})$ $(AB) > \frac{(A) \times (B)}{N}$ (গ) $(AB) = \frac{(A) \times (B)}{N}$ (ঘ) কোনোটিই নয়। ২৮। যদি $b_{xv}=0.6,\ r=0.9$ এবং $\sigma_x=6$ হয়, তবে variance of x-এর মান হল (গ) 81 (খ) 16 (ঘ) 4 | ২৯। সহপরিবর্তন গুণাঙ্ক-এর মান নির্ণয় করো যখন প্রতিগমন সহগদ্বয় যথাক্রমে -0.9 এবং -0.4। $(\overline{\Phi}) \pm 0.6$ (খ) 0.6 (গ) -0.36(ঘ) −0.6 | ৩০। যদি A এবং B ঘটনাদ্বয় পরস্পর স্বাধীন হয়, তবে কোন্টি মিথ্যা? (ক) A এবং B^C স্বাধীন (খ) A^C এবং B স্বাধীন (গ) A^C এবং B^C স্বাধীন (ঘ) কোনোটিই নয়। ৩১। Laspeyre এবং Paasche's index number-গুলির সমান্তরীয় মধ্যক হল (季) Bowley's price index (খ) Walsh's price index (প) Fisher's price index (ঘ) Kelly's price index | ৩২। কালীন সারিতে মূলত কত প্রকারের উপাংশ? (ক) তিন প্রকারের (গ) দুই প্রকারের (খ) চার প্রকারের (ঘ) পাঁচ প্রকারের। **৩৩।** চক্রীয় পরিবর্তনের পর্যায় কাল হল (খ) দুই বংসর (ক) এক বৎসর (ঘ) দূই বৎসরের বেশি। (গ) এক বৎসর বা কম ৩৪। Spearman's rank correlation সহগ নির্ণয় করো (আসন্নমান দুই দশমিক স্থান পর্যন্ত) যখন $\sum \! D^2 = 50$ এবং N = 20।

(季) 0.96

(켁) 0.99

(গ) 0.92

(ঘ) 0.93 |

৩৫। যদি A এবং B ঘটনাদ্বয় পরম্পর সম্পূর্ণ এবং পৃথক হয় এবং P(A)=0.3 তবে P(B)=0.4

(**季**) 0·6

(약) 0.7

(গ) 0.65

(ঘ) 0.8 |

বিভাগ - খ

যে-কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

o<×o

৩৬। যদি consumer price index number 100 থেকে 150-এ পরিবর্তিত হয় এবং একজন চাকুরিজীবীর বেতন ছিল 20,000 টাকা, তবে জীবনযাত্রার মান অপরিবর্তিত রাখার জন্য উক্ত চাকুরিজীবীর প্রত্যাশিত বেতন কত হবে?

(ক) 40,000 টাকা

(খ) 30,000 টাকা

(গ) 25.000 টাকা

(ঘ) 35.000 টাকা I

(5)

৩৭। নিম্নপ্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে

পণ্য	20	010	2018			
	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ		
A	8	20	12	30		
В	12	30	8	40		
С	16	10	20	6		

2010 সালকে ভিত্তিবৎসর হিসাবে ব্যবহার করে 2018 সালের Fisher-এর আদর্শ সূচক সংখ্যা হল

(**季**) 105·27

(খ) 88.34

(গ) 99.01

(ঘ) 112.5 |

৩৮। Pearson-এর সহপরিবর্তন গুণান্ধ নিম্নপ্রদূত্ত বিজ্ঞাপনের খরচ এবং বিক্রয়ের তথ্য থেকে নির্ণয় করো ঃ

বিজ্ঞাপনের খরচ ('000 টাকা)	39	65	62	90	82	75	25	98	36	78
বিক্রয় (লাখ টাকা)	47	53	58	86	62	68	60	91	51	84

(季) 0.87

(খ) 0.78

(গ) 1.78

(ঘ) −0.78 |

৩৯ একটি কোম্পানির একটি উৎপাদিত দ্রব্যের A এবং B, দুটি অংশ আছে। A অংশটি তৈরি হওয়ার সময়, 100 টির মধ্যে 9টি ক্রটিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। একইভাবে, B অংশটি তৈরি হওয়ার সময়, 100-টির মধ্যে 5-টি ক্রটিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। A এবং B-কে একত্রিত করে তৈরি করা দ্রব্যের ক্রটিহীন হওয়ার সম্ভাবনা হল

(**季**) 0·8455

(খ) 0.8546

(গ) 0.8645

(ঘ) কোনোটিই নয়।

80। নিম্নপ্রদত্ত পর্যবেক্ষণ শ্রেণি থেকে, 5 বছরের ভরযুক্ত চলমান গড় নির্ণয় করো 2015 এবং 2016 সালের জন্য, যদি ভর হয় যথাক্রমে 1, 2, 2, 2, 1।

<i>,</i> , , ,											
বৎসর	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
বার্ষিক বিক্রয় ('000 টাকা)	2	6	1	5	3	7	2	6	4	8	3

(ক) 4·875 এবং 5·125

(খ) 4.625 এবং 5.125

(গ) 4.375 এবং 4.625

(য) 4·625 এবং 4·875 ৷

৪১। নিম্নপ্রদত্ত তথ্যগুলি হল

х	1	2	3	4	5
у	6	8	11	8	12

x-এর উপর y-এর প্রতিগমন রেখার সমীকরণ হল

(5) y = 1.2x + 5.4

 $(\forall) \quad y = 3.4x - 7.8$

(§1) 2x + 3y = 18

 $(a) \quad y = 4.6x + 21.4 + 21.4$

8২। যদি $r_{xy}=0.6,\;cov(x,\;y)=12$ এবং $\sigma_{y}=5$ হয়, তবে σ_{x} -এর মান হল

(季) 6

(켁) 5

(গ) 4

(ঘ) 2.

৪৩। যদি প্রতিগমন সমীকরণদ্বয় 5x-2y-4=0 এবং 7y-4x=13 হয় তবে, \overline{x} ও \overline{y} -এর মানদ্বয় হল

(খ) 3, 2

(গ) 4, 6

(ঘ) 8, 12.

88। ভোক্তার দাম সূচক নির্দেশ করে—

(ক) বৃদ্ধি

(খ) হ্রাস

(গ) ক ও খ উভয়ই (ঘ) কোনোটিই নয়।

৪৫। যদি Laspeyre's এবং Paasche's দাম সূচক সংখ্যা হল যথাক্রমে 120.84 এবং 124.66 তাহলে Bowley's দাম সূচক নির্ণয়

(季) 102.75

(약) 122.75

(গ) 120.75

(ঘ) 245.5.

৪৬। কালীন সারি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, চলের উৎস অনুপাত থেকে প্রবণতা পদ্ধতি অনুসারে পরিমাণ করা যেতে পারে—

(ক) চক্রকারে

(খ) অনিয়মিত

(গ) মরসুমি

(ঘ) প্রবণতা।

8৭। তিনটি পক্ষপাতহীন মুদ্রা ছোড়া হল, ন্যুনতম দুটি টেল পাওয়ার সম্ভাবনা—

 $(\overline{\varphi}) \frac{1}{8}$ $(\overline{\forall}) \frac{1}{6}$

 $(\mathfrak{I}) \quad \frac{1}{3} \qquad \qquad (\mathfrak{I}) \quad \frac{1}{2} \, .$

৪৮। একটি ছক্কা পরপর দূবার ছোড়ার ফলে মোট 9 পাবার সম্ভাবনা—

 $(\overline{4}) \frac{1}{18} \qquad (\overline{4}) \frac{1}{6}$

(গ) $\frac{1}{9}$ (ঘ) $\frac{1}{136}$.

৪৯। যদি $P(A)=rac{3}{8}$, $P(B)=rac{5}{8}$, এবং $P(A\cup B)=rac{3}{4}$ হয়, তাহলে P(A/B) -এর মান হল

 $(\overline{5}) \frac{3}{5} \qquad (\overline{7}) \frac{2}{5} \qquad (\overline{7}) \frac{1}{5} \qquad (\overline{7}) \frac{4}{5}.$

৫০। প্রদত্ত মান হতে x-এর উপর y-এর প্রতিগমন সমীকরণ হল $\overline{x}=10,\ \overline{y}=15$ and $b_{yx}=2.50$

 $(\overline{\Phi}) \ y = -2.5x - 10$

(4) x = 2.5y - 10

(গ) y = 2.5x - 10

(a) x = -2.5y - 10.

[English Version]

The figures in the margin indicate ful

Module - I

Group-A

Answer any five questions.

ll mark	s.
	2×5
(d)	none of these.
(d)	4.
, the va	lue of other number is
(d)	5.
(d)	$\frac{(2n)!}{(n-1)!}.$
(d)	$4^{n}-1$.
(d)	ф
(d)	$^{n+2}C_r$.
npound	interest per annum compounded
(d)	₹ 70.90.

1. If $\log_{10} 2 = p$, then the value of $\log_{10} 5$ is

(a)
$$\frac{1}{p}$$

(a)
$$\frac{1}{p}$$
 (b) $1-p$ (c) $p-1$

(c)
$$p-1$$

2. If $\log_x 8 = \log_4 64$, then x =

(a) 3

(b) 2

(c) 1

3. If geometric mean of two numbers is 10 and one number is 5

(b) 10

(c) 15

4. Middle term of $\left(x + \frac{1}{x}\right)^{2n}$ is

(a) $\frac{(2n)!}{n!}$ (b) $\frac{(2n)!}{(n!)^3}$

(c) $\frac{(2n)!}{(n!)^2}$

5. Sum of all binomial coefficients of $(1+x)^{2n}$ is

(a) 2^n

(b) $2^n - 1$

6. For two non-empty sets A and B; $(A - B) \cap (B - A) =$

(a) A

(b) B

(c) $A \cup B$

7. ${}^{n}C_{r} + {}^{n}C_{r-1} = ?$

(a) $^{n+1}C_{r-1}$ (b) $^{n+1}C_r$

(c) ${}^{n}C_{r+1}$

8. What is the compound interest of ₹ 1,000 for two years at 3% com annually?

(a) ₹70.50

(b) ₹ 60.90

(c) ₹60.50

9. If ${}^{m+n}P_2 = 90$ and ${}^{m-n}P_3 = 120$, then m and n are respectively

(a) 8, 2

(b) 2, 8

(c) 3, 7

(d) 7, 3.

10. If $\frac{\log a}{q-r} = \frac{\log b}{r-p} = \frac{\log c}{p-q}$, then the value of $a^p b^q c^r$ is

(a) 0

(b) 2

(c) 1

(d) 3.

Please Turn Over

(a) 9,60,59,605

(b) 9,60,59,601

Group - BAnswer *any ten* questions.

 3×10

11.	The term free from	x in the expansion of $\left(x^2\right)$	$\left(2 + \frac{1}{x}\right)^{1/2}$ is	
	(a) 495	(b) -495	(c) 459	(d) 594.
12.	Four sets P, Q, R a	and S are given as $P = \{x : x\}$	$(2-9=0)$; $Q = \{3,0,$	$,-3$; $R = \{3,-3\}$; $S = \phi$.
	Which of the follow	ving statements is true?		
	(a) $P = Q$		(b) $P = R$	
	(c) $P = S$		(d) $Q = R$.	
13.	Out of 13 cricketer number of bowlers	•	many ways can a	team of 11 be selected so that the
	(a) 85	(b) 36	(c) 72	(d) None of these.
14.			-	eries worth ₹ 1,00,000 after 25 years e of compound interest be 9% per
	[Given log $1.09 = 0.09$]	$\cdot 0374$ and $\log 8.610 = 0.935$]	
	(a) ₹1185.77		(b) ₹1182.65	
	(c) ₹1180.65		(d) None of these	
15.	A man has 6 friend	ls. In how many ways may	he invite one or m	nore of them in a dinner?
	(a) 63	(b) 64	(c) 15	(d) 30.
16.	If a set A has 4 ele $(A \cup B)$ is	ments and a set B has 6 ele	ements, then the mi	nimum number of elements in a set
	(a) 6	(b) 4	(c) 12	(d) 24.
17.	If $A = \{1, 2, 3, 4\}$	$B = \{3, 4, 5\} \text{ and } C = \{3, 4, 5\}$	{1, 4, 5} then the v	value of $A - (B \cup C)$ is
	(a) {2}	(b) {1, 2}	(c) {2, 3}	(d) {4, 5}
18.	If the number of te	rms in $(1 + x)^n$ be 11, then	n the value of 5th t	erm is
	(a) $\frac{210}{x^4}$	(b) $210x^4$	(c) $105x^3$	(d) $210x^4$.
19.	Using Binomial the	orem the value of $(99)^4$ is		

(c) 9,60,58,601 (d) none of these.

		•		
20.	The value of log2 +	$-16\log\frac{16}{15} + 12\log\frac{25}{24} + 71$	$\log \frac{81}{80}$ is	
	(a) 0	(b) 5	(c) 1	(d) 2.
21.	If $\log_6 x = -3$, then	the value of x is		
	(a) $\frac{1}{6}$	(b) $\frac{1}{216}$	(c) $\frac{1}{3}$	(d) $\frac{1}{18}$
22.	The present value o	of Rs. 12,625 due is 4 years	at 6% p.a. compour	nd intere

- est [Given $(1.06)^4 = 1.2625$] 1S
 - (a) Rs. 8,000 (b) Rs. 12,000 (c) Rs. 10,000 (d) Rs. 9,000.
- 23. In what time will 6,500 amound to Rs. 11,180 at 6% p.a. simple interest? (a) 10 years (b) 12 years (c) 9 years (d) 6 years.
- **24.** If ${}^{14}C_r = {}^{14}C_{r+2}$, then the value of r is (a) 12
 - (b) 6 (c) 7 (d) 14.
- 25. The number of numbers greater than 7,000 can be formed with the digits 3, 5, 7, 8, 9, no digit being repeated is
 - (a) 120 (b) 192 (c) 60 (d) none of these.

Module - II

Group - A

Answer any five questions.

26. If n(A) = 2, n(B) = 3 and $P(A \times B)$ is the power set of $A \times B$, then $n(P(A \times B)) = ?$

- (a) 8
- (b) 16

- (c) 32
- (d) 64.
- **27.** Two attributes A and B are positive association if
 - (a) $(AB) > \frac{(A) \times (B)}{N}$

(b) $(AB) < \frac{(A) \times (B)}{N}$

(c) $(AB) = \frac{(A) \times (B)}{N}$

(d) None of these.

28. If $b_{xy} = 0.6$, r = 0.9 and $\sigma_x = 6$, then variance of x is

- (a) 9
- (b) 16

- (c) 81
- (d) 4.

 2×5

R(3rd	Sm.)-	Business M	Math. and Statistic	cs-				
·	G/GE	E-3.1Chg(C	C3HG)/CBCS		(10)			
29.	If t	wo regres	sion coefficien	ts are respective	ly – 0·	9 and -0.4 ,	the correlation c	oefficient is
	(a)	± 0.6	(b) 0.6		(c)	-0.36	(d) -0.6 .	
30.	If A	and B as	re two indepen	dent events, then	n whic	h is false?		
	(a)	A and B^{C}	C are independe	ent	(b)	A^C and B a	re independent	
	(c)	A^C and B	B^C are independent	dent	(d)	None of the	ese.	
31.	The	arithmeti	ic mean of Las	speyres' and Paa	sche's	index numb	pers is known as	
	(a)	Bowley's	s price index		(b)	Walsh's pri	ce index	
	(c)	Fisher's 1	price index		(d)	Kelly's pric	ce index.	
32.	Cor	nponents	of time series	are mainly of				
	(a)	three typ	oes		(b)	four types		
	(c)	two type	S		(d)	five types.		
33.	The	period of	f seasonal varia	ation is				
	(a)	one year			(b)	two years		
	(c)	less than	or equal to or	ne year	(d)	more than	two years.	
34.	Fine	d out Spea	arman's rank co	orrelation coeffic	ient w	when $\sum D^2 = 3$	50 and $N = 20$ (A	approximate up to two
	dec	imal place	es).					
	(a)	0.96	(b) 0.9	9	(c)	0.92	(d) 0.93.	
35.	If A	and B as	re mutually exc	clusive and exha	ustive	events and I	P(A) = 0.3, then A	P(B) =
	(a)	0.6	(b) 0·7		(c)	0.65	(d) 0·8.	
				Gr	oup -	В		

Answer any ten questions.

3×10

36. If consumer price index number changes from 100 to 150 and salary of an employee was ₹ 20,000. In order to maintain same standard of living, what should be his expected salary?

(a) ₹40,000

(b) ₹30,000

(c) ₹25,000

(d) ₹35,000.

37. Using the following data

Commodity	20	10	2018			
	Price	Quantity	Price	Quantity		
A	8	20	12	30		
В	12	30	8	40		
C	16	10	20	6		

Fisher's Ideal Price Index Number for the year 2018 with 2010 as base year is

- (a) 105·27
- (b) 88·34
- (c) 99·01
- (d) 112·5.
- **38.** Calculate Pearsonian coefficient of correlation between advertisement cost and sales as per the data given below:

Advertisement cost in ₹ '000	39	65	62	90	82	75	25	98	36	78
Sales in ₹ Lakh	47	53	58	86	62	68	60	91	51	84

- (a) 0.87
- (b) 0.78
- (c) 1.78
- (d) -0.78.
- **39.** An article manufactured by a company consists of two parts A and B. In the process of manufacture of part A, 9 out of 100 are likely to be defective. Similarly, 5 out of 100 are likely to be defective in the manufacture of part B. Calculate the probability that the assembled article will not be defective.
 - (a) 0.8455
- (b) 0.8546
- (c) 0.8645
- (d) None of these.
- **40.** From the following series of observations, calculate 5-yearly weighted moving average with weights 1, 2, 2, 2, 1 respectively for the years 2015 and 2016 are :

Year	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Annual sales (₹ '000)	2	6	1	. 5	3	7	2	6	4	8	3

(a) 4.875 and 5.125

(b) 4.625 and 5.125

(c) 4.375 and 4.625

(d) 4.625 and 4.875.

41. Following data is given:

x	1	2	3	4	5
у	6	8	11	8	12

The regression equation of y on x is

(a) y = 1.2x + 5.4

(b) y = 3.4x - 7.8

(c) 2x + 3y = 18

- (d) y = 4.6x + 21.4.
- **42.** If $r_{xy} = 0.6$, cov(x, y) = 12 and $\sigma_y = 5$ then the value of σ_x will be
 - (a) 6
- (b) 5

- (c) 4
- (d) 2.
- **43.** If the regression equations are 5x 2y 4 = 0 and 7y 4x = 13, the value of \overline{x} & \overline{y} will be
 - (a) 2, 3
- (b) 3, 2
- (c) 4, 6
- (d) 8, 12.

- 44. Consumer Price Index indicates
 - (a) Rise
- (b) Fall

(c) Both of a & b (d) none of these.

45. If Laspeyre's and Paasche's Price Index number are 120.84 and 124.66 respectively, then Bowley's Price Index will be

- (a) 102.75
- (b) 122.75
- (c) 120.75
- (d) 245.5.

46. In time series analysis, which source of variation can be estimated by the ratio-to-trend method

- (a) Cyclical
- (b) Irregular
- (c) Seasonal
- (d) Trend.

47. Three unbiased coins are tossed. The Probability of getting at least 2 tails is

- (a) $\frac{1}{8}$
- (b) $\frac{1}{6}$

- (c) $\frac{1}{3}$ (d) $\frac{1}{2}$.

48. The Probability of getting a sum 9 from two consecutive throws of a dice is

- (a) $\frac{1}{18}$ (b) $\frac{1}{6}$

- (c) $\frac{1}{9}$ (d) $\frac{1}{136}$.

49. If $P(A) = \frac{3}{8}$, $P(B) = \frac{5}{8}$, $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$, then the value of P(A/B) is

- (a) $\frac{3}{5}$ (b) $\frac{2}{5}$

- (c) $\frac{1}{5}$ (d) $\frac{4}{5}$.

50. The regression equation of y or x from the following values is

 $\bar{x} = 10$, $\bar{y} = 15$ and $b_{yx} = 2.50$

(a) y = -2.5x - 10

(b) x = 2.5y - 10

(c) y = 2.5x - 10

(d) x = -2.5y - 10.